

ŚCIGA NA LODÓWKĘ

Jak poznać, że kot cierpi

Skrót poradnika z bloga Opatulo: opatulo.pl/blog. Złota zasada: porównuj kota z jego własną normą sprzed miesiąca – ból to mozaika drobnych zmian, nie jeden objaw.

CZERWONE FLAGI W ZACHOWANIU (2–3 naraz przez ponad dobę = telefon do lecznicy)

- Nie wskakuje tam, gdzie zawsze · schodzi po schodach inaczej · więcej leży, mniej patroluje.
- Załatwia się obok kuwety · przestał się myć (sierść w strąkach) albo liże obsesyjnie jedno miejsce.
- Chowa się w nowych miejscach · unika dotyku, syczy przy głaskaniu · je mniej, odchodzi od miski.
- Miauczy inaczej niż zwykle · mruczenie nie oznacza, że jest dobrze – koty mruczą też w bólu.

SKALA GRYMASU – sprawdź pyszczek (30 s, z daleka, gdy kot jest w spokoju)

- Uszy: rozjeżdżają się na boki, „spłaszczone”? · Oczy: przymrużone, napięte?
- Pyszczek: ściągnięty, spięty? · Wąsy: sztywne, wyprostowane do przodu? · Głowa: poniżej linii barków?
- Punkty: 0 norma · 1 lekka zmiana · 2 wyraźna zmiana. Wynik 4+/10 = prawdopodobny ból → konsultacja.
- Pozycja bólowa: sztywny „chlebek” z garbem, wyprostowane przednie łapy, głowa nisko – nie czekaj, aż samo przejdzie.

NATYCHMIAST DO LECZNICY

- Kocur siedzący w kuwecie bez efektu – stan zagrożenia życia, jedziesz od razu.
- Brak jedzenia ponad 24–48 h (głodówka u kota może uszkodzić wątrobę).
- Pozycja bólowa, która nie znika mimo spokoju.

NIGDY

- Żadnych ludzkich leków przeciwbólowych. Paracetamol to dla kota trucizna – ułamek tabletki może zabić. Ibuprofen też jest groźny. Leki przeciwbólowe dla kota przepisuje wyłącznie weterynarz.