

ŚCIGA NA LODÓWKĘ

Pies lub kot po zabiegu – pierwsze 48 godzin

Skrót poradnika z bloga Opatulo: opatulo.pl/blog. Powieś na lodówce – niech będzie pod ręką, kiedy będzie potrzebna.

DOBA 1 – wybudzanie

- Legowisko na podłodze (nie łóżko, nie kanapa) – ciche miejsce, ciepły koc.
- Najpierw mała ilość wody, jedzenie dopiero po kilku godzinach – mała, lekkostrawna porcja.
- Ubranko pooperacyjne lub kołnierz przez cały czas – jedno liżnięcie potrafi zniszczyć szwy.
- Inne zwierzęta w osobnym pokoju na dobę.
- Chwianie się, drzenie, „płacz” i szklany wzrok po narkozie są normalne.

DOBA 2 – powrót apetytu

- Apetyt powinien wracać. Jeśli zwierzę nadal nie je, nie pije, wymiotuje albo nie oddaje moczu – dzwoń do lekarza.
- Lekkie zaczerwienienie i niewielki obrzęk wokół szwu to norma.

DO ZDJĘCIA SZWÓW (10–14 DNI)

- Ochrona rany non stop – do zdjęcia szwów, nie „aż przestanie się interesować”.
- Pies: krótkie spacery tylko na smyczy. Kot: bez wychodzenia i wysokich pótek.
- Zero kąpieli i moczenia rany. Codzienny rzut oka na szew (20 sekund rano).

ALARM – dzwoń do weterynarza NATYCHMIAST

- Krwawienie z rany, które nie ustaje · ropa, brzydki zapach, narastający obrzęk.
- Apatia lub brak apetytu ponad 24 h · powtarzające się wymioty · brak moczu ponad 24 h.
- Białe dziąsła, płytki szybki oddech, osłabienie (możliwy wstrząs) · gorączka powyżej ok. 39,5°C.